

Nr. 1585 din 01.09.2026

Către,
PRIMĂRII - TOATE
PRODUCĂTORII AGRICOLI, ASOCIAȚIILE DE PRODUCĂTORI

Referitor: Măsurile pentru prevenirea introducerii în România a organismului dăunător de carantina
Lycorma delicatula (spot clothing wax cicada)

Având în vedere confirmarea oficială recentă a prezenței unor focare active ale organismului dăunător de carantină *Lycorma delicatula*, în proximitatea geografică a României, respectiv în Republica Moldova (zona municipiului Chișinău), Oficiul Fitosanitar Suceava a demarat campania de conștientizare și alertă timpurie, pentru recunoașterea morfologică a insectei și raportarea imediată a oricărei suspiciuni. Cea mai importantă măsură fiind depistarea precoce și notificarea imediată a autorităților fitosanitare.

Statut de reglementare - *Lycorma delicatula* este organism de carantină pentru Uniunea Europeană, inclus în Anexa II, Partea A a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2072 (organisme de carantină a căror prezență nu este cunoscută pe teritoriul Uniunii). Specia figurează și pe lista EPPO A1. Până în prezent, ea nu este prezentă în România și nici în Uniunea Europeană; detectarea din Republica Moldova este prima din imediata vecinătate.

În prezent, România își menține statutul de teritoriu liber de acest dăunător. Totuși din cauza capacității extreme de polifagie a insectei (cu impact devastator de până la 90% în pomicultură și viticultură) și a riscului major de introducere prin fenomenul de „autostop”, (hitchhiking) pe mijloacele de transport rutier, feroviar și containere de marfă, se dispun următoarele măsuri de prevenire și vigilență:

- 1. Monitorizarea cu prioritate a plantei - gazda santinelă:** se va acorda o atenție deosebită arealelor populate de *Ailanthus altissima* (oțetar fals / cenușar), arbore invaziv ce constituie suportul biologic esențial pentru reproducerea dăunătorului.
- 2. Inspecția vizuală:** verificarea materialului săditor lemnos, buștenilor și a mijloacele de transport provenite din zone afectate, căutând mase de ouă cu aspect de noroi uscat.
- 3. Depistare precoce:** amplasarea de capcane lipicioase sau de tip „circle trunk” pe arborii gazdă, în special pe cenușar (*Ailanthus altissima*).
- 4. Nu se va deplasa materialul suspect:** se va evita transportul lemnului, paleților sau al altor obiecte pe care se observă mase de ouă.
- 5. Notificare imediată:** se va raporta orice suspiciune la Oficiul Fitosanitar Suceava sau la Autoritatea Națională Fitosanitară (ANF).

Va rugăm să acordați maximă atenție prezentei informări și să asigurați diseminarea operativă a acesteia către toți cei interesați. Depistarea precoce a unui organism de carantină face diferența între un focar izolat, care poate fi eradicat, și o răspândire greu de controlat.

Cu stimă,
Coordonator Oficiul Fitosanitar Suceava
ing. Anton Codrin Alexandru



FIȘA DĂUNĂTORULUI LYCORMA DELICATULA



ALERTĂ FITOSANITARĂ · ORGANISM DE CARANTINĂ

Lycorma delicatula, dăunător de carantină, detectat lângă România

Focar izolat în R. Moldova — depistarea precoce face diferența

Lycorma delicatula, cunoscută în engleză drept „spotted lanternfly”, este o insectă din ordinul Hemiptera (familia Fulgoridae), originară din Asia de Est. Este un dăunător puternic polifag: atacă peste 100 de specii de plante din sectoarele horticole, viticole și forestiere. Gazda sa preferată este *Ailanthus altissima* (cenușarul), dar printre plantele gazdă importante economic se numără *Vitis vinifera* (vița-de-vie), *Juglans* (nucul), *Acer* (artarul), *Prunus* (cireș, piersic, prun), *Malus* (măr) și *Salix* (salcie).

MODUL DE ATAC

Nimfele și adulții înțepă țesutul conducător (floemul) și extrag seva, provocând răni cu scurgeri de sevă, ofilirea lăstarilor, necrozarea ramurilor și slăbirea generală a plantei. În plus, insecta elimină cantități mari de rouă de miere (excreții zaharoase), pe care se dezvoltă fumagina - un strat negru ce acoperă frunzele și fructele, blochează fotosinteza și duce la defoliere timpurie. În plantațiile viticole și pomicole, efectul este direct economic: recolte reduse, acumulare scăzută de zaharuri, deprecierea calității fructelor și chiar pieirea butucilor de vița-de-vie.

CUM SE RĂSPÂNDEȘTE

Se răspândește mai ales prin activitatea umană. Pe distanțe lungi, *Lycorma delicatula* se răspândește în principal prin transportul ouălor. Femela depune pontă nu doar pe plante, ci și pe suprafețe inerte: ambalaje și paleți din lemn, bușteni, piatră de carieră, containere, utilaje și vehicule. Astfel, masele de ouă camuflate pot călători internațional, neobservate. De aceea, controlul materialului lemnos, al mijloacelor de transport și al mărfurilor provenite din zone afectate este prima linie de apărare.

CUM ÎL RECUNOASTEM ÎN FUNCȚIE DE STADIU

Aspectul insectei se schimbă mult pe parcursul anului. Reperetele de mai jos ajută la o identificare rapidă:

Stadiu	Perioadă	Cum arată
Ouă	Octombrie – Mai	Mase de 30–50 de ouă, acoperite cu o secreție ceroasă cenușiu-maronie, cu aspect de noroi uscat și crăpat, depuse pe scoarță sau pe obiecte netede.
Nimfe, vârstele I–III	Mai – Iulie	Corp de 3,5–9 mm, negru, cu pete albe distincte pe corp și picioare; foarte agile și săritoare.
Nimfe, vârsta IV	Iulie – August	Corp de 11–15 mm, roșu aprins, cu pete albe și dungi negre.
Adulți	Iulie – Noiembrie	21–27 mm; aripi anterioare gri cu pete negre la bază; aripi posterioare roșii cu pete negre și o bandă albă transversală.

Sursa datelor de identificare: *buletin de alertă regională ANF (Oficiul Fitosanitar Iași)* și *EPPO Global Database*.





Lycorma delicatula (LYCMDE) - <https://gd.eppoint>



Lycorma delicatula (LYCMDE) - <https://gd.eppoint>



